

PROVA NON ESTRATTA

CP

Chiuso

SZ

DOMANDE CONCORSO PER N. 7 POSTI DI DIRIGENTE MEDICO NEUROLOGIA - ASL ROMA 4, ASL ROMA 5 E ASL ROMA 6 - PROVA SCRITTA - BUSTA 4

PROVA ESTRATTA, SESSIONE SUPPLEMENTIVA

Tramite

Spro

- 1) Quale tra i seguenti farmaci dovrebbe essere sospeso per 48 ore dopo un'angiografia cerebrale?
 A apixaban
 B aspirina
 C metformina
 D atorvastatina

- 2) Dopo riscontro occasionale di un aneurisma cerebrale non-rotto, il rischio di sanguinamento è più elevato se è localizzato in quale arteria?
 A comunicante posteriore
 B corioidea anteriore
 C comunicante anteriore
 D carotide interna

- 3) Nello studio clinico multicentrico, randomizzato-controllato, che ha confrontato gli interventi di endoarterectomia carotidea (CEA) con le procedure di stenting carotideo (CAS), trial CREST 1 (Carotid Revascularization Endarterectomy versus Stenting Trial), qual è la frequenza di infarto miocardico (IM) e ictus periprocedurale nei due gruppi?
 A Frequenza di IM e di ictus periprocedurale simile nei due gruppi
 B Frequenza di IM più alta nel gruppo CEA, frequenza di ictus periprocedurale più elevata nel gruppo CAS
 C Frequenza di IM più alta nel gruppo CAS, frequenza di ictus periprocedurale più elevata nel gruppo CAS
 D Frequenza di IM più alta nel gruppo CAS, frequenza di ictus periprocedurale più elevata nel gruppo CEA

- 4) Quale tra i seguenti è un più elevato fattore di rischio di ictus nel sesso femminile rispetto ai soggetti di sesso maschile?
 A scarsa attività fisica
 B fibrillazione atriale
 C ipertensione
 D basso livello socio-economico

- 5) In quale periodo si registra il più elevato rischio di ictus nelle donne in gravidanza?
 A PRIMO TRIMESTRE
 B nel peripartum fino a 2 settimane postpartum
 C TERZO TRIMESTRE
 D SECONDO TRIMESTRE

- 6) Nelle donne con emicrania in corso di gravidanza quante volte è incrementato il rischio di un evento cerebrovascolare acuto?
 A 15-volte
 B è simile alla popolazione generale
 C 10-volte
 D 5-volte

- 7) Nel corso di quale meningite fungina è spesso richiesto di ripetere la rachicentesi?
 A criptococchi
 B coccidiomicosi
 C blastomicosi
 D istoplasmosi

- 8) La più comune complicanza neurologica nei pazienti ricoverati per COVID-19 è?
 A sindrome di Guillain-Barré
 B miosite
 C ictus
 D encefalopatia

- 9) Un trattamento profilattico con aciclovir è indicato per 4 settimane dopo terapia con quale dei seguenti farmaci?

OR

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

- A natalizumab
- B alemtuzumab
- C rituximab
- D eculizumab

- 10) Qual è la più comune complicanza neurologica in corso di HIV?
- A polineuropatia simmetrica distale
 - B demenza associata a HIV
 - C leucoencefalopatia multifocale progressiva
 - D meningite da criptococco
- 11) Nelle persone sottoposte a trapianto di cellule ematopoietiche quando i pazienti sono a maggior rischio di sviluppo di una malattia secondaria a riattivazione di una preesistente infezione latente?
- A oltre 1 anno
 - B il rischio rimane elevato allo stesso livello durante tutto il periodo di immunosoppressione
 - C tra 2 e cinque mesi
 - D nel primo mese
- 12) Una cicatrice perimaculare visibile all'esame oftalmoscopico è associata a un'infezione indotta da quale tra i seguenti agenti patogeni?
- A treponema pallidum
 - B plasmodium malariae
 - C bartonella henselae
 - D citomegalovirus
- 13) Quale delle seguenti terapie "disease-modifying" per sclerosi multipla recidivante remittente SM-RR è più strettamente associata con un aumentato rischio di infezioni erpetiche, inclusa la riattivazione di varicella?
- A natalizumab
 - B fingolimod
 - C dimetil-fumarato
 - D glatiramer acetato
- 14) Quali dei seguenti tipi di nistagmo osservato durante episodi di vertigine prolungata è più compatibile con una causa periferica vestibolare come la neurite vestibolare?
- A nistagmo orizzontale unidirezionale
 - B nistagmo battente verso il basso
 - C nistagmo bidirezionale evocato dallo sguardo
 - D nistagmo torsionale
- 15) Quale tra le seguenti condizioni si caratterizza per attacchi di vertigine di durata molto breve che si ripetono molte volte al giorno?
- A TIA vertebrobasilare
 - B fistola perilinfatica
 - C sindrome di Ménière
 - D parossismi indotti da compressione del nervo vestibolare
- 16) Per quali dei seguenti gruppi di pazienti è meno efficace il trattamento di riposizionamento canalicolare a causa di limitazioni meccaniche?
- A pazienti molto anziani
 - B pazienti che non tollerano gli spostamenti
 - C pazienti obesi
 - D pazienti con cifosi marcata
- 17) Un uomo di 65 anni è inviato a consulenza neurologica per una vertigine oggettiva insorta da circa una settimana. Alla manovra di Dix-Hallpike è osservato un breve nistagmo battente verso il basso. L'esame neurologico è per il resto negativo. Viene posta diagnosi di vertigine posizionale parossistica benigna con interessamento del canale anteriore. Quale tra i seguenti è più strettamente legato con questa forma di vertigine posizionale benigna?
- A degenerazione cerebellare
 - B ipoacusia grave
 - C trauma cranico
 - D precedente trattamento di riposizionamento canalicolare
- 18) A un uomo di 45 anni è diagnosticata una sindrome di Ménière dopo una storia di 7 mesi di attacchi ricorrenti di vertigine oggettiva associata a acufeni e senso di pienezza nell'orecchio interno destro. Quale tra queste caratteristiche è tipica di un attacco di questa sindrome?

- A nausea quasi assente
- B vertigine che raggiunge rapidamente la massima intensità
- C risoluzione complete in 1 ora
- D senso di pienezza auricolare dopo l'attacco

-
- 19) Quali tra i seguenti farmaci è considerato di prima linea per il trattamento dello stato di male convulsivo?
- A levetiracetam
 - B lorazepam
 - C fenitoina
 - D valproato di sodio
-
- 20) Quale tipo di malformazione vascolare è più comunemente complicata da emorragia cerebrale?
- A teleangectasia capillare
 - B malformazione arterovenosa
 - C angioma venoso
 - D malformazione della vena di Galeno
-
- 21) Qual è la sensibilità della TAC cranio nell'individuare un'emorragia subaracnoidea spontanea dopo una settimana dall'insorgenza ?
- A 20%
 - B 40%
 - C 80%
 - D 60%
-
- 22) Dopo un intervento neurochirurgico di craniotomia per evacuazione di un ematoma subdurale della convessità, l'insorgenza dopo 6 ore dal termine della procedura di movimenti involontari all'arto superiore controlaterale, dovrebbe indurre il neurologo a intraprendere, dopo un controllo TAC cranio negativo per recidiva emorragica o ischemia cerebrale, quale altra misura?
- A effettuare una RMN cranio
 - B somministrare corticosteroidi EV
 - C effettuare un EEG
 - D trasferire immediatamente il paziente al neurochirurgo
-
- 23) Nell'attività di consulenza neurologica in unità di terapia intensiva quale tipo di manifestazione clinica va ricercata e trattata nei pazienti con sindrome di Guillain-Barré in ventilazione assistita per insufficienza respiratoria?
- A coagulazione intravascolare disseminata
 - B ipersalivazione
 - C ipernatremia
 - D disfunzione autonoma
-
- 24) Quali caratteristiche elettroencefalografiche hanno maggiore affidabilità nel giudizio prognostico nei pazienti con encefalopatia ipossico-ischemica?
- A soppressione maggiore del 50% dell'attività di fondo in assenza di sedazione e perdita di reattività
 - B attività epilettiforme e perdita di reattività
 - C grafoelementi epilettiformi e attività delta ritmica generalizzata
 - D attività delta ritmica generalizzata e soppressione maggiore del 50% dell'attività di fondo in assenza di sedazione
-
- 25) L'assenza bilaterale di quale componente dei potenziali evocati somatosensoriali per stimolo del nervo mediano è più probabilmente associata con una prognosi infausta in caso di encefalopatia ipossico-ischemica?
- A potenziali N20
 - B potenziali N9
 - C potenziali N13
 - D potenziali P25
-
- 26) Quale tra le seguenti complicanze disautonomiche della neuropatia diabetica è associata a più elevata mortalità?
- A ipersalivazione
 - B gastroparesi
 - C ipotensione ortostatica
 - D disfunzione urinaria
-
- 27) La delezione nel gene responsabile della malattia Charcot-Marie-Tooth tipo 1A può causare quali tra le seguenti condizioni?

- A neuropatia ereditaria del plesso brachiale
- B deficit di acido fitanico
- C malattia di Kennedy
- D neuropatia tomaculare (HNPP)

28) Quale dei seguenti test dovrebbe essere parte della valutazione iniziale in tutti i pazienti con sospetta sindrome da tachicardia posturale?

- A tilt test
- B ecocardiogramma transtoracico
- C ECG Holter
- D ECG a 12 derivazioni

29) Nella sindrome di Morvan, l'incremento di quali tra i seguenti anticorpi è associato con il riscontro all'esame elettromiografico di ipereccitabilità del nervo periferico, miocimia e disfunzione autonoma?

- A anticorpi antineuronali nucleari tipo 1 (ANNA-1)
- B anticorpi anti citrullina
- C anticorpi anti cellule di Purkinje tipo 2 (PCA-2)
- D anticorpi anti contactina (CASPR2)

30) La metformina può ridurre l'assorbimento di quale tra le seguenti vitamine?

- A piridossina
- B cobalamina
- C tiamina
- D α -tocoferolo

OR

[Handwritten signatures]